

小児用薬剤の飲ませ方

薬剤	味、香り	水	麦茶	オレンジ ジュース	牛乳	スポーツ 飲料	アイスク リーム	プリン	ココア	ヨーグ ルト
アジスロマイシン細粒	苦い(パイン味)	○	×	×	×	×	○	○	○	—
アスピリン	少し酸味	—	—	○	—	—	○	—	—	—
アドソルビン	無味	(溶け ない)	—	—	—	—	○	△	—	○
アレジオン DS	甘み・苦味・ヨーグルト	○	△	○	○	△	○	○	○	○
エリスロシン DSW	甘み・苦味・バニラ	—	×	×	○	×	○	○	—	×
オゼックス細粒	甘い・いちご	○	○	×	吸収影響あり	×	○	○	○	×
カロナール細粒	甘み・苦味・オレンジ	○	×	×	—	×	○	△	△	—
キプレス細粒	わずかに甘い	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クラバモックス DS	甘い(いちご)	—	—	○	×	—	○	○	—	○
クラリスロマイシンDS	苦い(バナナ)	○	—	×	○	×	○	○	○	×
タミフル DS	甘み・苦味	○	×	○	×	○	○(チョコ)	×	△	○
タニニン酸アルブミン	無味	×	×	×	×	×	○	○	×	○
テオフィリン DS	甘い味(ピーチ)	○	×	×	○	×	○	○	○	—
乳酸カルシウム	苦い	○	○	○	—	○	○	○	△	—
プラシルカスト DS	甘い	○	△	○	○	○	○	○	○	—
ミヤ BM 細粒	無味	×	○	○	○	○	○	—	—	×
ムコダイン DS	甘酸っぱい・ピーチ	○	×	○	—	○	○	×	×	○
メイアクト MS	甘み・苦味・バナナ	○	○	△	○	×	○	○	○	×
メプテン顆粒	無臭甘味	—	—	—	—	○	○	—	—	—
ワイドシリン細粒	甘い(フルーツミックス)	○	○	○	○	○	○	○	—	○

○:味が飲みやすくなる —:資料なし、不明、評価異なる場合有り △:変わらない ×:まずくなる




主な服用補助食品例と特徴

食品例	特徴
アイスクリーム	味が濃く、特に苦味の強い薬をマスクしやすい。
ヨーグルト	混ぜると苦味が出たり、薬効が低下するものもあるため注意が必要。
プリン	甘みが強く、カラメルの苦味によって苦みのある薬をマスクすることもできる。
市販の服薬補助ゼリー	混ぜすぎずに挟み込むようにするよい。製品によりpHに違いがあり、酸性の製品では苦味が出る薬もあるため、注意が必要。
コンデンスミルク ピーナツクリーム	甘みが強く、粘り気もあるため薬の食感や味をマスクしやすい。
チョコレート ココア	味が濃く、特に酸味の強い薬をマスクしやすい。
味噌汁、ポタージュ のりの佃煮	甘みが嫌いな患児に適している。
バナナ	香りも強く、味やおいをマスクしやすい。ペースト状にし、薬を挟み込むようにするとよい。

服用補助食品のpH

酸性側の食品に混ぜると、コーティングが剥がれやすくなり、原末の苦味を感じやすい。



← お薬ゼリーも、様々なpHがあります

(酸性で苦味が出たり含量が低下する薬剤)

- ・アジスロマイシン
- ・エリスロマイシン
- ・クラリスロマイシン
- ・ユナシン細粒

(牛乳と混合すると、キレート結合して効果が落ちる薬剤)

- ・オゼックス細粒
- ・ミノマイシン顆粒



☆クラバモックス細粒は、AUC が低下するという報告があるが、臨床上問題ないと考えられている。

より安全な医療をみんなで行っていきましょう!!